

Оценочные материалы по учебной дисциплине

«Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата»

Дополнительная профессиональная программа: «Специальное дошкольное образование: Дошкольная дефектология»

Настоящие оценочные материалы используются для проведения промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций» (далее - Академия) по учебной дисциплине «Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» при реализации дополнительной профессиональной программы «Специальное дошкольное образование: Дошкольная дефектология».

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» проводится в форме с помощью тестирования.

Тестирование проводится с помощью системы дистанционного обучения (далее - СДО). В ней содержатся в электронном виде ответы (ключи) к тестированию.

Правила проведения тестирования

На тестирование отводится 1 академический час.

При выполнении тестирования необходимо ответить на все поставленные вопросы, пропуск ответов не допускается.

Правило оценки результата тестирования обучающегося

Результат тестирования определяется в зависимости от доли (в процентах) вопросов, на которые даны верные ответы, в общем количестве вопросов в тестировании (с округлением до целых процентов), что рассчитывается по формуле: $(\text{Количество верно отвеченных вопросов}) / (\text{Общее количество вопросов в тестировании}) \times 100$.

Результат тестирования в виде оценки по зачетной шкале оценивания («зачтено» / «не зачтено») определяется в соответствии с приведенной ниже шкалой соответствия:

Шкала соответствия

Результат менее 50% (не включая) - "Не зачтено"

Результат от 50% (включительно) до 100% - "Зачтено"

Содержание тестирования

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите стадии течения ДЦП: |
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - начальная - ранняя резидуальная - поздняя резидуальная - поворотная |

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Ранняя резидуальная стадия обычно длится: |
| Тип вопроса | Вопрос с одиночным выбором (один верный вариант ответа) |
| Инструкция | Укажите верный вариант ответа |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - до 2-3 лет - до 4-5 лет - до 6-7 лет |

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите характеристики спастической диплегии: |
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - Возникает при повреждении моторных зон коры головного мозга с одной стороны. - При этой форме ДЦП наблюдается паралич всех четырех конечностей, больше выраженный в ногах. - Чаше эта форма ДЦП появляется у недоношенных детей. - Физическое развитие ребенка замедляется: он поздно начинает держать голову, сидеть. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите характеристики спастической диплегии: |
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - Начало ходьбы задерживается до восьми-девяти лет из-за низкого тонуса мышц ног. - К симптоматике относится приведение бедер к животу, «перекрещенные» при опоре ножки, согнутые колени в положении лежа. - Гипертонус в ручках очень высок. - К двигательным нарушениям часто присоединяется умственная отсталость. |

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите характеристики двойной гемиплегии: |
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - Возникает в результате повреждения моторных зон обоих полушарий мозга. - Сопровождается параличом только рук. - Дети не могут сидеть и стоять. - Речь отсутствует. |

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Болезнью Литтля называется: |
| Тип вопроса | Вопрос с одиночным выбором (один верный вариант ответа) |
| Инструкция | Укажите верный вариант ответа |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - Спастическая диплегия - Двойная гемиплегия - Гемипаретическая форма ДЦП - Гиперкинетическая форма ДЦП |

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите характеристики гемипаретической формы ДЦП: |
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - При ней отмечается атрофия (похудание) мышц. - При ней отмечается задержка роста парализованных конечностей. - Мышцы резко расслаблены на больной стороне. - Больше парализована рука, чем нога. |

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите характеристики гемипаретической формы ДЦП: |
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - Причиной является повреждение моторных зон коры, причем с обеих сторон. - Эта форма встречается намного реже, чем болезнь Литтля. - Симптоматика различается в зависимости от локализации. - Левополушарное повреждение провоцирует дислексию, дисграфию, нарушение фонематического восприятия. |

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите характеристики гиперкинетической формы ДЦП: |
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none"> - Сюда относятся все случаи ДЦП, когда основным симптомом являются насильственные движения в конечностях. - Тремор всегда отсутствует. - Судороги проявляются через несколько месяцев после рождения, нарастают и достигают максимума в раннем возрасте. - Поражены базальные ганглии, т.е. повреждение носит подкорковый характер. |

| | |
|--------|------------------------------------------------------------|
| Вопрос | Укажите характеристики гиперкинетической формы ДЦП: |
|--------|------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип вопроса | Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа) |
| Инструкция | Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько) |
| Варианты ответов | <ul style="list-style-type: none">- При этой форме ДЦП обычно отсутствуют речевые нарушения.- Ходить дети начинают очень поздно.- Интеллект страдает приблизительно у каждого четвертого ребенка.- Наблюдается тремор. |